

MATEMATICAS III



PROCESOS DE

PRODUCCION

EJERCICIOS RESUELTOS DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA

OBJETIVO:

Aplicar las técnicas estadísticas para el manejo de datos que nos permitan obtener gráficos, medidas de tendencia y calcular probabilidades.

ANTECEDENTES:

- ✚ **Estadística:** es la rama de la matemática que nos permite recoger, organizar y analizar datos. Existen dos conceptos importante dentro de la estadística que nos permiten analizar y estudiar dichos datos, estos son: población y muestra.
- ✚ **Población:** es el conjunto de datos que caracteriza el fenómeno que se desea estudiar.
- ✚ **Muestra:** es un subconjunto de la población a estudiar, el cual es necesario que sea representativo de toda la población.
- ✚ **Gráfica:** es una representación de la relación entre variables, muchos tipos de gráficos aparecen en estadística, según la naturaleza de los datos involucrados y el propósito de la gráfica, es la de representar los

valores tabulados obtenidos de los muestreos o los datos del total de la población.

✚ **Distribución de frecuencia:** Al resumir grandes colecciones de datos, es útil distribuirlos en clases o categorías, y determinar el número de individuos que pertenecen a cada clase llamado *frecuencia de clase*. Una disposición tabular de los datos por clases junto con las frecuencias correspondientes de clase se llaman distribuidores de frecuencia o tablas de frecuencia.

✚ **Medidas de dispersión:** Describen la cantidad de dispersión o variabilidad que se encuentra entre los datos. Datos bastante agrupados poseen valores relativamente pequeños, y datos más dispersos tienen valores más grandes. El agrupamiento más extenso ocurre cuando los datos carecen de dispersión.

MATERIAL UTILIZADO:

- ✚ Lápiz
- ✚ Cuaderno de apuntes

HERRAMIENTA, EQUIPO:

- ✚ Calculadora
- ✚ Computadora
- ✚ Software estadístico MINITAB

DESARROLLO:

Efectuar los siguientes ejercicios:

1. Los datos que se muestran a continuación representan el costo de la energía eléctrica durante el mes de julio del 2006 para una muestra aleatoria de 50 departamentos con dos recamaras en una ciudad grande.

Costo de energía eléctrica en dólares.


96 171 202 178 147 102 153 197 127 82
 157 185 90 116 172 111 148 213 130 165
 141 149 206 175 123 128 144 168 109 167
 95 163 206 175 130 143 187 166 139 149
 108 119 150 154 114 135 191 137 129 158

- a) Determine una tabla de frecuencias, para $K = 7$

K	LIMITES DE CLASE		f	X_i	f_i	h_i	H_i
	LS	LI					
1	81	100	4	90.5	4	0.08	0.08
2	101	120	8	110.5	12	0.32	0.32
3	121	140	12	130.5	24	0.8	0.8
4	141	160	8	150.5	32	1.44	1.44
5	161	180	10	170.5	42	2.28	2.28
6	181	200	4	190.5	46	3.2	3.2

7	201	220	4	210.5	50	4.2	4.2
			$\Sigma f = 50$				

- b) Elabore un histograma de frecuencias y polígono de frecuencias con los datos.



- c) Alrededor de que cantidad parece concentrarse el costo mensual de energía eléctrica.
 R = alrededor de 148 (valor de la media)
2. Se identificó una muestra de estudiantes que poseía automóviles producidos por la General Motors y se registró la marca de cada automóvil. A continuación se presenta la muestra que se obtuvo (Ch = Chevrolet, P = Pontiac, O = Oldsmobile, B = Buick, Ca = Cadillac):

Ch B Ch P Ch O B Ch Ca Ch
 B Ca P O P P Ch P O O
 Ch B Ch B Ch P O Ca P Ch
 O Ch Ch B P Ch Ca O Ch B
 B O Ch Ch O Ch Ch B Ch B


- a) Encuentre el número de automóviles de cada marca que hay en la muestra.
 n = 50

MARCA DEL AUTOMOVIL	FRECUENCIA
CH	19
P	8
O	9
B	10
CA	4
	TOTAL = 50

b) ¿Qué porcentaje de estos automóviles son Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac?

MARCA DEL AUTOMOVIL	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
CH	19	38
P	8	16
O	9	18
B	10	20
CA	4	8
	TOTAL = 50	TOTAL = 100

c) Trace una gráfica de barras que muestre los porcentajes encontrados en el inciso b).




3. Un policía de una ciudad, usando radar, verificó la velocidad

de los automóviles que circulaban por una calle de la ciudad:

27 23 22 38 43 24
 25 23 22 52 31 30
 29 28 27 25 29 28
 26 33 25 27 25
 21 23 24 18 23

Elabore una gráfica de puntos para estos datos.



4. Los siguientes son los números de torsiones que se requirieron para cortar 12 barras de aleación forjada: 33, 24, 39, 48, 26, 35, 38, 54, 23, 34, 29 y 27. Determine:

- a) La media
 $\bar{x} = \Sigma x/n = 410/12$
 $\bar{x} = 34.17$
- b) La mediana
 $\tilde{x} = 33.50$
- c) El rango promedio
 Rango promedio = $(V_{\text{menor}} + V_{\text{mayor}})/2$
 Rango promedio = 38.50
5. Por un error, un profesor borró la calificación obtenida por uno de diez alumnos. Si los otros nueve estudiantes obtuvieron 43, 66, 74, 90, 40, 52, 70, 78 y 92 y la media de las diez calificaciones es 67, ¿Qué calificación borró el profesor?
 Σx (de 9 datos) = 605
 \bar{x} de 10 datos = 67
 $\bar{x} = \Sigma x/n$; Σx (de 10 datos) = $(\bar{x})(n) = 67 \times 10 = 670$
 calificación = $x = 670 - 605 = 65$
 calificación = 65
6. En los siguientes ejercicios, calcule el rango, el rango promedio, la varianza y la desviación estándar para los datos que se dan.
- a) Los valores que se dan son pesos (en onzas) de carnes listadas en el menú de un restaurante como cortes "Porterhouse de 20 onzas" (basados en datos recolectados por un estudiante del autor).

17 20 21 18 20 20 20 18 19 19
 20 19 21 20 18 20 20 19 18 19

$n = 20$

$\Sigma x = 386$

Rango = Valor mayor - Valor menor = 21 - 17

Rango = 4

$$\text{Rango promedio} = (\text{Valor menor} + \text{Valor mayor})/2 = (17 + 21)/2$$

$$\text{Rango promedio} = 19$$

$$s^2 = 1.168$$

$$s = 1.081$$

b) Dígitos seleccionados en la lotería Maryland Pick Three:

0 7 3 6 2 7 6 6 6 3 8 1 7 8 7
1 6 8 6 9 5 2 1 5 0 3 9 9 0 7

$$n = 30$$

$$\Sigma x = 148$$

$$\text{Rango} = \text{Valor mayor} - \text{Valor menor} = 9 - 0$$

$$\text{Rango} = 9$$

$$\text{Rango promedio} = (\text{Valor menor} + \text{Valor mayor})/2 = (0 + 9)/2$$

$$\text{Rango promedio} = 4.5$$

$$s^2 = 8.754$$

$$s = 2.959$$

c) Concentraciones de alcohol en la sangre de 15 conductores implicados en accidentes mortales y luego condenados a prisión (basados en datos del departamento de Justicia de Estados Unidos).

0.27 0.17 0.17 0.16 0.13 0.24 0.29 0.24
0.14 0.16 0.12 0.16 0.21 0.17 0.18

$$n = 15$$

$$\Sigma x = 2.81$$

$$\text{Rango} = \text{Valor mayor} - \text{Valor menor} = 0.29 - 0.12$$

$$\text{Rango} = 0.17$$

$$\text{Rango promedio} = (\text{Valor menor} + \text{Valor mayor})/2 = (0.12 + 0.29)/2$$

$$\text{Rango promedio} = 0.205$$

$$s^2 = 0.00262$$

$$s = 0.0512$$

7. La concentración de sólidos suspendidos en agua de un río es una característica ambiental importante. Un artículo científico reportó sobre la concentración (en partes por millón, o ppm) para varios ríos diferentes. Supongamos que se obtuvieron las siguientes 50 observaciones para un río en particular:

55.8 60.9 37.0 91.3 65.8
42.3 33.8 60.6 76.0 69.0
45.9 39.1 35.5 56.0 44.6
71.7 61.2 61.5 47.2 74.5
83.2 40.0 31.7 36.7 62.3
47.3 94.6 56.3 30.0 68.2

75.3	71.4	65.2	52.6	58.2
48.0	61.8	78.8	39.8	65.0
60.7	77.1	59.1	49.5	69.3
69.8	64.9	27.1	87.1	66.3

a) Calcule la media

$$n = 50$$

$$\Sigma x = 2927$$

$$\bar{x} = \Sigma x/n = 2927/50$$

$$\bar{x} = 58.54$$

b) Calcule la media recortada al 25% y la media recortada al 10%

Media recortada al 25%

$$50 \times 0.25 = 12.5 = 13$$

$$n = 50 - (13 \text{ valores m\u00ednimos} + 13 \text{ valores m\u00e1ximos}) = 50 - 26 = 24$$

$$\Sigma x \text{ (de 24 datos)} = 1423$$

$$\bar{x} = \Sigma x/n = 1423/24$$

$$\bar{x} = 59.31$$

Media recortada al 10%

$$50 \times 0.10 = 5$$

$$n = 50 - (5 + 5) = 50 - 10 = 40$$

$$\Sigma x \text{ (de 40 datos)} = 2333.90$$

$$\bar{x} = \Sigma x/n = 2333.90/40$$

$$\bar{x} = 58.35$$

c) Calcule la varianza y la desviaci\u00f3n est\u00e1ndar

$$s^2 = 270.85$$

$$s = 16.46$$

8. Use los datos del ejercicio 7 (50 observaciones de un r\u00edo) y calcule lo siguiente:

a) Q_1 , Q_2 y Q_3

Para Q_1

$$np = 50 \times \frac{1}{4} = 12.5 = 13$$

$$Q_1 = (45.9 + 47.2)/2 = 46.55$$

$$Q_1 = 46.55$$

Para Q_2

$$np = 50 \times \frac{1}{2} = 25$$

$$Q_2 = (60.7 + 60.9)/2 = 60.8$$

$$Q_2 = 60.8$$


Para Q_3

$$np = 50 \times \frac{3}{4} = 37.5 = 38$$

$$Q_3 = (69.3 + 69.8)/2 = 69.55$$

$$Q_3 = 69.55$$

b) Realice un diagrama de caja con estos datos



c) Calcule P_{15} , P_{20} , P_{25}

$$P_{15} = (k/100)n = (15/100) \times 50 = 7.5 = 8$$

$$P_{15} = 39.1$$

$$P_{20} = (k/100)n = (20/100) \times 50 = 10$$

$$P_{20} = 40$$

$$P_{25} = (k/100)n = (25/100) \times 50 = 12.5 = 13$$

$$P_{25} = 45.9$$

9. Use los datos del ejercicio 1 (costos de energía eléctrica para una muestra de 50 departamentos) y calcule lo siguiente:

a) Q_1 , Q_2 y Q_3

Para Q_1

$$np = 50 \times \frac{1}{4} = 12.5 = 13$$

$$Q_1 = (127 + 128)/2 = 127.5$$

$$Q_1 = 127.5$$

Para Q_2

$$np = 50 \times \frac{1}{2} = 25$$

$$Q_2 = (148 + 149)/2 = 148.5$$

$$Q_2 = 148.5$$

Para Q_3

$$np = 50 \times \frac{3}{4} = 37.5 = 38$$

$$Q_3 = (171 + 172)/2 = 171.5$$

$$Q_3 = 171.5$$

b) Calcule el percentil correspondiente a: 191, 70 y 175

$$\text{Percentil de 191} = 44/50 = 0.88$$

$$\text{Percentil de 191} = 0.88$$


$$\text{Percentil de 70} = \text{No existe}$$

$$\text{Percentil de 175} = 39/50 = 0.78$$

$$\text{Percentil de 175} = 0.78$$

c) Realice un diagrama de caja

10. Los



siguientes son los números de los minutos durante los cuales una persona debió esperar el autobús hacia su trabajo en 15 días laborales: 10, 1, 13, 9, 5, 2, 10, 3, 8, 6, 17, 2, 10 y 15. Determine:

a) La media

$$\bar{x} = \Sigma x/n = 111/14$$

$$\bar{x} = 7.93$$

b) La mediana

$$\tilde{x} = 8.50$$

c) Trace un diagrama de caja.

Para Q_1

$$np = 14 \times \frac{1}{4} = 3.5 = 4$$

$$Q_1 = (3 + 5)/2 = 4$$

$$Q_1 = 4$$

Para Q_2

$$np = 14 \times \frac{1}{2} = 7$$

$$Q_2 = (8 + 9)/2 = 8.5$$


$$Q_2 = 8.5$$

Para Q_3

$$np = 14 \times \frac{3}{4} = 10.5 = 11$$

$$Q_3 = (10 + 13)/2 = 11.5$$

$$Q_3 = 11.5$$



BIBLIOGRAFIA UTILIZADA:

ESTADISTICA ELEMENTAL

MARIO F. TRIOLA
PEARSON EDUCACION.

**PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIEROS DE MILLER Y
FREUND**

RICHARD A JOHNSON
PRENTICE HALL

AUTOR:

Ing. Luis Arturo García Navarro